

Мікродобрива для ГАРБУЗОВИХ КУЛЬТУР

● Баст Комплекс

Кальцій (Ca)	– 90 г/л
Марганець (Mn)	– 70 г/л
Магній (Mg)	– 70 г/л
Азот (N)	– 70 г/л
Бор (B)	– 60 г/л
Молибден (Mo)	– 4 г/л

● Баст Марганець Плюс

Марганець (Mn)	– 200 г/л
Магній (MgO)	– 150 г/л
Азот (N)	– 80 г/л
Цинк (Zn)	– 80 г/л
Мідь (Cu)	– 70 г/л

● Баст Цинк

Цинк (Zn)	– 750 г/л
Азот (N)	– 20 г/л

● Баст Бор Енерджі

Азот (N)	– 50 г/л
Бор (B)	– 37 г/л
L-аміно кислоти	– 25 г/л
Органічні кислоти	– 20 г/л

● Баст NPK Плюс 0-80-500

Калій (K ₂ O)	– 500 г/л
Фосфор (P ₂ O ₅)	– 80 г/л

● Баст NPK Плюс 45-200-65

Азот (N)	– 45 г/л
Фосфор (P ₂ O ₅)	– 200 г/л
Калій (K ₂ O)	– 65 г/л
Органічні кислоти	– 50 г/л
L-аміно кислоти	– 20 г/л
Сірка (SO ₃)	– 10 г/л
Цинк (Zn)	– 5,0 г/л
Бор (B)	– 2,7 г/л
Мідь (Cu)	– 1,0 г/л
Марганець (Mn)	– 0,6 г/л
Залізо (Fe)	– 0,3 г/л
Молибден (Mo)	– 0,1 г/л

ПРОГРАМА ПІДЖИВЛЕННЯ ГАРБУЗОВИХ КУЛЬТУР

Контакти:



+38044 374 50 43



info@bast.land
www.bast.land



м. Київ, вул. Козацька 116,
офіс 202



www.bast.land

BAST
ФОРМУЛА ВАШОГО ВРОЖАЮ



НОРМИ ВИТРАТИ ТА ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРІВ для підживлення гарбузів

У фазу 4-6 листків



Баст NPK Плюс 45-200-65 (2-4 л/га), Баст Комплекс (0,5-1,0 л/га), Баст NPK Плюс 0-80-500 (1-2 л/га) та Баст Бор Енерджі (1-2 л/га)

Основна задача до зав'язування плодів - створення достатньої області лози та листя для підтримки врожаю. Важливою в цій фазі є СБАЛАНСОВАНА програма живлення рослин. Якщо азот не збалансований із засвоєнням інших необхідних поживних речовин (таких як фосфор, калій, кальцій, магній, бор, молібден), здоров'я рослин та якість плодів будуть поставлені під загрозу.

Підживлення мікродобривами в цю фазу забезпечить рослини всіма необхідними елементами та допоможе активно нарощувати зелену масу.

У фазу цвітіння/зав'язування плодів



Баст NPK Плюс 45-200-65 (2-4 л/га), Баст Комплекс (1,5-2,0 л/га), Баст NPK Плюс 0-80-500 (1-2 л/га) та Баст Бор Енерджі (1-2 л/га), Баст Цинк (0,2 л/га)

Калій - підтримує ріст рослин і максимізує кількість квіток, фосфор - важливий для розвитку плодів. Магній покращує цвітіння та врожайність, бор і цинк максимально сприяють зав'язуванню, розвитку і плодоношенню.

У фазу дозрівання плодів



Баст Комплекс (1,5-2,0 л/га), Баст NPK Плюс 0-80-500 (1-2 л/га) та Баст Марганець Плюс (1-2 л/га)

Калій і бор є антистресовими поживними речовинами які допомагають підтримувати поглинання води. Стрес через вологу також є основною причиною дефіциту кальцію в культурах, що призводить до гниття плодів та проблем із терміном зберігання. Марганець та цинк впливають на кількість насіння, урожайність насіння, урожайність плодів і вміст олії в гарбузі та пом'якшують несприятливі наслідки, спричинені сильним водним стресом.

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ГАРБУЗОВИХ КУЛЬТУР

- **КАЛІЙ:** Високий рівень доступного калію є ключовим для гарбузів, оскільки калій сприяє ефективному використанню води та загальному здоров'ю рослин. Калій і фосфор потрібні у великій кількості протягом усього вегетаційного періоду.
- **КАЛЬЦІЙ:** в період вегетативного зростання підтримує інтенсивний ріст рослин. Кальцій, як і бор, необхідний для росту пилкової трубки, критичного етапу в процесі запліднення. Під час наливу плодів підтримує якість шкірки, твердість і якість м'якоти. Забезпеченість кальцієм важлива для попередження виникнення верхівкової гнилі.
- **МАГНІЙ:** забезпеченість магнієм сприяє збільшенню продуктивності та накопиченню цінних цукрів та інших вуглеводів у рослинах, що підвищує їх стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища.
- **МАРГАНЕЦЬ, ЦИНК:** впливають на кількість насіння, урожайність насіння, урожайність плодів і вміст олії в гарбузі та пом'якшують несприятливі наслідки, спричинені сильним стресом.
- **БОР:** забезпечує добре цвітіння, запилення та зав'язування плодів, сприяє засвоєнню та рухливості кальцію.



РЕЗУЛЬТАТ ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ БАСТ

- забезпечення рослин всіма необхідними елементами в критичні фази розвитку
- мікроелементи збільшують швидкість фотосинтезу, що сприяє добре розвиненій листовій поверхні та якості лози та, як наслідок, збільшує врожайність
- збільшується кількість та врожайність плодів на рослину
- покращуються ознаки врожайності насіння (кількість насіння на плід, маса 1000 насінин, вміст олії, білка, золи, клітковини, цукру)
- підвищується стійкість рослин до корневих та плодових гнилей