

Микроудобрение **БАСТ БОР**

Концентрированное борное удобрение для внекорневой подкормки сельскохозяйственных культур, кустов и деревьев.

Состав:

Бор (В) – 155 г/л

Азот (N) - 70 г/л

- бор находится в органической форме (борэтаноламин), что способствует быстрому его поглощению растениями
- содержит смачиватель, что значительно улучшает распределение рабочего раствора удобрения на поверхности листа и улучшает усвоение бора растением
- содержит гумектант, продлевающий высыхание раствора на листовой пластине
- в баковых смесях совместимо с большинством удобрений и пестицидов



Контакты:



+38044 374 50 43



info@bast.land
www.bast.land



г. Киев, ул. Казацкая 116,
офис 202



www.bast.land

BAST
ФОРМУЛА ВАШЕГО ВРОЖАЮ

**МИКРОУДОБРЕНИЕ
БАСТ БОР**





РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЯ БАСТ БОР

- компенсирует дефицит бора у растений
- стимулирует метаболизм и повышает стрессоустойчивость растений
- стимулирует рост и развитие точек роста, формирование листьев, цветков, процессы опыления и плодообразования
- оптимизирует водный режим растений в условиях засухи
- повышает устойчивость растений к корневым и плодовым гнилям
- снижает содержание нитратов в плодах, улучшает азотный обмен
- повышает устойчивость растений к заболеваниям
- повышает урожайность и улучшает качество урожая

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно смешивайте продукт перед применением. Приготовление рабочего раствора для внекорневой подкормки осуществляется в день обработки. Заполните бак на $\frac{3}{4}$ водой, добавьте продукт во время перемешивания. Долейте воду до метки и проведите обработку.

Раствор следует перемешивать до конца опрыскивания. Не применять при наступлении экстремальных погодных условий, как засуха, заморозки, дождь или когда такие условия ожидаются.

РАПС



Для озимого рапса – 0,5-1 л/га в фазе 4-6 листьев осенью. 1-2 л/га в фазу весенней розетки. При необходимости повторить через 10-14 дней до начала цветения. Расход воды: 300 л/га.

ПОДСОЛНЕЧНИК



В фазе 4-6 листьев до бутонизации – 1-3 л/га. Повторить при необходимости через 10-14 дней в течение этого периода. Расход воды: 300 л/га.

ЗЕРНОВЫЕ



0,5-1 л/га от появления 4 листа до начала выхода в трубку. Норма расхода воды – 300 л/га.

ГОРОХ, ФАСОЛЬ, СОЯ



0,5 – 2 л/га в фазе бутонизации – начало цветения. При необходимости повторить через 10-14 дней. Расход воды: 300 л/га

КАПУСТА



В фазе 4-6 листьев – 2-3 л/га с повторной обработкой в интервале 10-14 дней, во избежание скрытого или видимого дефицита бора. Расход воды – 300 л/га.

КАРТОФЕЛЬ



1-2 подкормки с нормой 0,5 - 1 л/га в фазу бутонизации. При необходимости повторить после цветения. Норма расхода воды – 400 л/га.

ТОМАТЫ, БАКЛАЖАНЫ, ПЕРЦЫ ОТКРЫТОЙ ГРУНТА



Первая подкормка – 1 л/га в рассадe, после формирования первой кисти. Вторая подкормка – 1 л/га после высадки в грунт. Норма расхода воды – 200-300 л/га.

КУКУРУЗА



0,25-1 л/га в фазе 3-8 листьев. При необходимости повторить спустя 10-14 дней. Расход воды – до 300 л/га.

ФУНКЦИИ БОРА В РАСТЕНИИ

Бор участвует во многих физиологических и биохимических процессах и нужен культурам на протяжении всего жизненного цикла, поскольку выполняет важные функции:

- стимуляция цветения, образование пыльников, опыление, прорастание пыльцы и рост пыльцевых трубок
- структурная целостность клеточной стенки, ионные потоки через мембрану, ферменты, связанные с плазмалеммой, разделение и удлинение клеток
- налив семян, качество плодов и срок хранения, продуктивность растений
- налив семян, качество и срок хранения плодов, продуктивность растений
- развитие латеральных корней, формирование корневых волосков, фиксация азота и поглощение железа
- фенольный и азотный обмен, метаболизм нуклеиновой кислоты и β -индоуксусной кислоты, дыхание растений, транспорт сахаров

