

Техническая спецификация

Наименование продукции	BAST В (БАСТ Бор)
Описание	Жидкое концентрированное борное удобрение. Применяется для листовой подкормки сельскохозяйственных культур.
Внешний вид	желтоватая жидкость
Растворимость в воде	100%
рН	7.0-9.0
Плотность	1.35±0.05 г/см ³
Состав	160 г/л - бор (В) 70 г/л – азот (N)
Фасовка	1 л, 5 л, 10 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КУЛЬТУРА	BAST В (БАСТ Бор) Листовая подкормка
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	0,5-1 л/га от появления 4-го листка до начала выхода в трубку. Расход воды: 200-300 л/га.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	1 л/га в начале цветения, повторить через 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га.
КУКУРУЗА	0,25-1 л/га от 3 до 8 листьев. При необходимости повторить подкормку с интервалом 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га.
ПОДСОЛНЕЧНИК	1-3 л/га в фазе 4-6 листьев до бутонизации. Расход воды: 200-300 л/га.
БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	0,5 - 2 л/га в фазе бутонизации - начала цветения. При необходимости повторить через 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га
РАПС	0,5-1 л/га в фазе 4-6 листьев осенью (для озимого рапса). 1-2 л/га в фазу весенней розетки. При необходимости повторить через 10-14 дней до начала цветения. Расход воды: 200-300 л/га.
КАРТОФЕЛЬ	от одной до двух обработок с нормой 0,5 - 1 л/га в фазу бутонизации. При необходимости повторить после цветения. Расход воды: 300-400 л/га.
КАПУСТА	2-3 л/га в фазе, в фазе 4-6 листьев с повторной обработкой в интервале 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га.
ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ	0,5-2 л/га в случае проявления визуальных признаков (или по результатам функциональной диагностики) дефицита бора. При необходимости повторить подкормку через 10-14 дней.