

Техническая спецификация

Наименование продукции	BAST MolyBor Energy (БАСТ МолиБор Энерджи)
Описание	Жидкое концентрированное борное удобрение. Содержит так же молибден и азот. Применяется для листовой подкормки сельскохозяйственных культур.
Внешний вид	желтоватая жидкость
Растворимость в воде	100%
pH	2.5-3.5
Плотность	1.27±0.05 г/см ³
Состав	35 г/л – бор (В) 50 г/л – азот (N) 5 г/л – молибден (Mo) 25 г/л – L-амино кислоты 10 г/л – органические кислоты
Фасовка	1 л, 5 л, 10 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КУЛЬТУРА	BAST MolyBor Energy (БАСТ МолиБор Энерджи) Листовая подкормка
БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	1 - 2 л/га в фазе 3-5 тройчатых листьев до бутонизации – начала цветения. При необходимости повторить обработку через 10–14 дней. Расход воды: 200-300 л/га.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	1-2 подкормки с нормой 1-2 л/га с интервалом 10 - 14 дней за период вегетации. Расход воды: 200-300 л/га
РАПС	1-2 л/га в фазе 4-10 листьев осенью, при необходимости повторить через 10-14 дней. Весной в фазу стеблевания. При необходимости повторить обработку с интервалом 10-14 дней и до начала цветения. Расход воды: 200-300 л/га.
САХАРНАЯ СВЕКЛА	2-3 л/га. Первую подкормку проводят в фазу 4-6 листьев. Повторяют в фазы смыкания листьев в строках и смыкания листьев в междурядьях. Расход воды: 200-300 л/га.
ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ	1-2 л/га в случае проявления визуальных признаков (или по результатам функциональной диагностики) дефицита бора или молибдена. При необходимости повторить подкормку через 10-14 дней. Расход воды: 300-400 л/га.