

Технічна специфікація

Найменування продукції	BAST Мо (Баст Молібден)
Опис	Рідке концентроване молібденове добриво. Застосовується для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур та обробки насіння
Зовнішній вигляд	зеленувата рідина
Розчинність у воді	100%
pH	3,0-5,0
Густина	1,60 ±0.05 г/см ³
Склад	250 г/л - молібден (Mo) 125 г/л - фосфор (P ₂ O ₅)
Фасування	1 л, 5 л, 10 л

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРА	BAST Мо (Баст Молібден) Позакореневе підживлення
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ	0,2 л/га у фазі кущіння (для озимих культур восени). Витрата води: 200-300 л/га.
ТОМАТИ	0,2 л/га у фазі вкорінення. При необхідності повторити фазу масового наливу плодів. Витрата води: 200-300 л/га.
СОЯ	0,2-0,25 л/га у фазі 3-5 трійчастого листа. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.
РІПАК	При одноразовому застосуванні – 0,25 л/га на початку стеблування. При помірному дефіциті - 0,25 л/га у фазі 4-6 листків та 0,25 л/га на початку стеблування. Не обприскувати під час цвітіння. Витрата води: 200-300 л/га.
КАПУСТА	0,2-0,25 л/га. Перше підживлення через 10-15 днів після сходів. Друге підживлення через 10 днів. У разі підвищеної кислотності ґрунту можливе третє підживлення. Витрата води: 200-300 л/га.
ІНШІ КУЛЬТУРИ	0,2-0,25 л/га за прояву візуальних ознак дефіциту молібдену або за результатами функціональної діагностики. При необхідності повторити підживлення через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.
ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ	0,5-1 л/т насіння