Мікродобриво

БАСТ БОР

Концентроване борне добриво для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, кущів та дерев.

Склад:
Бор (B) – 160 г/л
Азот (N) – 70 г/л

- бор знаходиться в органічній формі (боретаноламін), що сприяє швидкому його поглинанню рослинами
- містить змочувач, що значно покращує розподілення робочого розчину добрива на поверхні листка та покращує засвоєння бору рослиною
- містить гумектант, який подовжує зберігання розчину на листовій пластині
- в бакових сумішах сумісне з більшістю мінеральних добрив та пестицидів

МІКРОДОБРИВО БАСТ БОР

Контакти:

+38044 374 50 43

info@bast.land
www.bast.land

м. Київ, вул. Козацька 116, офіс 202

www.bast.land

BAST
ФОРМУЛА ВАШОГО ВРОЖАЮ

РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВА БАСТ БОР

- компенсує дефіцит бору у рослин
- стимулює метаболізм та підвищує стресостійкість рослин
- стимулює ріст та розвиток точок росту, формування листків, квіток, процеси запліднення та плодоутворення
- оптимізує водний режим рослин в умовах посухи
- підвищує стійкість рослин до кореневих та плодових гнилей
- знижує вміст нітратів в плодах, покращує азотний обмін
- підвищує стійкість рослин до захворювань
- підвищує врожайність та покращує якість врожаю

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Ретельно змішуйте продукт перед застосуванням. Приготування робочого розчину для позакореневого підживлення здійснюється в день обробки. Заповніть бак на ¾ водою, додайте продукт під час перемішування. Долийте воду до мітки і проведіть обробку. Розчин слід перемішувати до кінця обприскування. Не застосовувати при настанні екстремальних погодних умов, як то, посуха, приморозки, дощ або коли такі умови очікуються.

РІПАК
Для озимого ріпаку – 0,5-1 л/га у фазі 4-6 листків восени. 1-2 л/га в фазу весняної розетки. При потребі повторити через 10-14 днів до початку цвітіння. Витрата води: 200-300 л/га.

СОНЯШНИК
В фазі 4-6 листків до бутонізації – 1-3 л/га. Повторити за потреби через 10-14 днів протягом цього періоду. Витрата води: 200-300 л/га.

ЗЕРНОВІ
0,5-1 л/га від появи 4 листка до початку виходу в трубку. Витрата води: 200-300 л/га.

КУКУРУДЗА
0,25-1 л/га в фазі 3-8 листків. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

ГОРОХ, КВАСОЛЯ, СОЯ
0,5 - 2 л/га у фазі бутонізації - початок цвітіння. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

КАПУСТА
У фазі 4-6 листків – 2-3 л/га з повторною обробкою в інтервалі 10-14 днів, з метою уникнення прихованого або видимого дефіциту бору. Витрата води: 200-300 л/га.

КАРТОПЛЯ
1-2 підживлення із нормою 0,5-1 л/га у фазу бутонізації. При необхідності повторити після цвітіння. Витрата води: 300-400 л/га.

ТОМАТИ, БАКЛАЖАНИ, ПЕРЦІ
Перше підживлення – 1 л/га в розсаді, за формуванням першої китиці. Друге підживлення – 1 л/га після висадки у грунт. Витрата води: 200-300 л/га.

ІНШІ КУЛЬТУРИ
0,5-2 л/га за прояви візуальних ознак дефіциту бору або за результатами функціональної діагностики. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

ФУНКЦІЇ БОРУ В РОСЛИНІ

Бор бере участь у багатьох фізіологічних та біохімічних процесах і потрібен культурам протягом усього життєвого циклу, оскільки виконує важливі функції:

- стимуляція цвітіння, утворення пиляків, запилення, проростання пилку та ріст пилкових трубок
- структурна цілістність клітинної стінки, іонні потоки через мембрану, ферменти, пов'язані з плазмалемою, поділ і подовження клітин
- налив насіння, якість плодів та термін зберігання, продуктивність рослин
- транспорт калію до продихів листя, роботу продихів, вміст хлорофілу та фотосинтез
- розвиток латеральних коренів, формування кореневих волосків, фіксація азоту та поглинання заліза
- фенольний і азотний обмін, метаболізм нуклеїнової кислоти та β-індооцтової кислоти, дихання рослин, транспорт цукрів