

Мікродобриво

БАСТ МОЛІБОР ЕНЕРДЖІ

Рідке концентроване борне добриво, містить азот та молібден. Призначене для позакореневого підживлення сільсько-господарських культур.

Склад:

Бор (В) – 35 г/л Молібден (Мо) – 5 г/л
Азот (N) – 50 г/л L-аміно кислоти – 25 г/л
органічні кислоти – 20 г/л

- бор знаходиться в органічній формі (борат-поліольні комплекси), азот в амідній формі легко засвоюється рослиною
- характеризується збільшеною швидкістю листової абсорбції бору порівняно зі сполуками бору з етаноламіном
- біологічна активність добрива покращується за рахунок комбінації поліольних комплексів бору з органічними та вільними L-амінокислотами
- містить зволожувач, який подовжує висихання розчину добрива на поверхні, що дуже важливо в умовах спекотного клімату
- не містить баластних речовин



Контакти:



+38044 374 50 43



info@bast.land
www.bast.land



м. Київ, вул. Козацька 116,
офіс 202



www.bast.land

BAST
ФОРМУЛА ВАШОГО ВРОЖАЮ

**МІКРОДОБРИВО
БАСТ МОЛІБОР
ЕНЕРДЖІ**



РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВА БАСТ МОЛІБОР ЕНЕРДЖІ

- компенсує дефіцит бору та молібдену у рослин
- забезпечує стійкість рослин під час різкої зміни температур, регулюючи транспірацію впродовж дня
- стимулює цвітіння та запилення, впливає на проростання пилкової трубки і формування зав'язі
- підвищує стійкість рослин до борошнистої роси
- регулює процеси формування вторинних структур клітинних стінок
- стимулює метаболізм та підвищує стресостійкість рослин
- оптимізує водний режим рослин в умовах посухи
- покращує азотний обмін, знижує вміст нітратів в коренеплодах
- підвищує вміст білку у бобових культур
- покращує використання нітратів та засвоєння фосфору
- підвищує врожайність та покращує якість врожаю

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Ретельно змішуйте продукт перед застосуванням. Приготування робочого розчину для позакореневого підживлення здійснюється в день обробки. Заповніть бак на $\frac{3}{4}$ водою, додайте продукт під час перемішування. Долийте воду до мітки і проведіть обробку. Розчин слід перемішувати до кінця обприскування. Не застосовувати при настанні екстремальних погдних умов, як то, посуха, приморозки, дощ або коли такі умови очікуються.



БОБОВІ

1-2 л/га у фазі 3-5 трійчастих листків до бутонізації - початку цвітіння. При необхідності повторити обробку через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.



ОВОЧЕВІ

1-2 підживлення з нормою 1-2 л/га з інтервалом 10-14 днів за період вегетації. Витрата води: 200-300 л/га.



РІПАК

1-2 л/га у фазі 4-10 листків восени, за потреби повторити через 10-14 днів. Навесні в фазу стеблуння. При необхідності повторити обробку з інтервалом 10-14 днів і до початку цвітіння. Витрата води: 200-300 л/га.



БУРЯК ЦУКРОВИЙ

2-3 л/га. Перше підживлення проводять у фазу 4-6 листків. Повторюють в фазі змикання листя у рядках та змикання листя у міжряддях. Витрата води: 300-400 л/га.



ІНШІ КУЛЬТУРИ

0,2-0,25 л/га за прояву візуальних ознак дефіциту молібдену або за результатами функціональної діагностики. При необхідності повторити підживлення через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

ФУНКЦІЇ МОЛІБДЕНУ, БОРУ В РОСЛИНІ

Молібден та Бор беруть участь у багатьох фізіологічних та біохімічних процесах і потрібні культурам протягом усього життєвого циклу, оскільки виконують важливі функції:

- регулює азотний, вуглеводний та фосфорний обмін
- впливає на вміст хлорофілу та фотосинтез, на синтез вітамінів та на транспорт калію до продихів листя
- позитивно впливає на синтез білків та амінокислот у бульбочках бобових культур
- стимуляція цвітіння, утворення пиляків, запилення, проростання пилку та ріст пилкових трубок
- налив насіння, якість плодів та термін зберігання, продуктивність рослин
- фенольний і азотний обмін, метаболізм нуклеїнової кислоти та β -індооцтової кислоти, дихання рослин, транспорт цукрів

