

Технічна специфікація

Найменування продукції	BAST Zn OxiChelate (БАСТ Цинк ОксіХелат)
Опис	Комбіноване цинкове добриво містить оксидну та хелатну форму цинку. Для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, кущів та дерев.
Зовнішній вигляд	біла рідина (суспензія)
Розчинність у воді	добре змішується з водою, містить нерозчинні компоненти (оксид цинку)
pH	7.5-9.5
Густина	1.70±0.05 г/см ³
Склад	700 г/л – цинк загальний (Zn) (670 г/л – цинк в оксидній формі (ZnO) + 30 г/л – цинк в хелатній формі (EDTA-ZnNa ₂))
Фасування	1 л, 5 л, 10 л

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРА	BAST Zn OxiChelate (БАСТ Цинк ОксіХелат) Позакореневе підживлення
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ	0,5-1 л/га від появи 2 листка до утворення 2 вузла. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.
ТОМАТИ, ПЕРЕЦЬ	0,3 – 1,0 л/га у фазу 4-6 листків. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів Витрата води: 200-300 л/га.
КУКУРУДЗА	0,4-1 л/га в фазі від 3 до 8 листків. Рекомендується доповнити підживлення добривом BAST Bor Energy 1-1,5 л/га. Витрата води: 200-300 л/га.
СОНЯШНИК	0,2-1 л/га в фазі 2 пари листків. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.
БОБОВІ КУЛЬТУРИ	0,5-1 л / га. у фазі 5-7 листків. Витрата води: 200-300 л/га.
РІПАК	0,5-1 л/га в фазу бутонізації. Витрата води: 200-300 л/га.
КАРТОПЛЯ	0,5-1 л/га в фазу 4-6 листків. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 300-400 л/га.
КАПУСТА	0,5-1 л/га в фазу 4-9 листків. Витрата води: 300-400 л/га.
БУРЯК ЦУКРОВИЙ	0,3-1,0 л/га в фазу 4-6 листка, за потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 300-400 л/га.
ПЛОДОВІ ДЕРЕВА ЗЕРНЯТКОВІ	0,5-1 л/га навесні в фазу зеленої бруньки. Друге підживлення після збору врожаю – 0,3-0,5 л/га. Витрата води: 500-1000 л/га.
МАЛИНА	0,2-0,5 л/га у фазу зеленої бруньки. Витрата води: 300-500 л/га.
СУНИЦЯ	0,3-0,5 л/га у фазу зеленої бруньки, повторна обробка у фазу білої бруньки та після збирання врожаю. Витрата води: 300-500 л/га.