Мікродобриво
БАСТ NPK Плюс 0-80-500

Рідке калійно-фосфорне добриво з збільшеним вмістом калію. Призначене для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур.

Склад: **Калій (N) – 500 г/л**
Фосфор (P_2O_5) – 80 г/л

- висококонцентроване калійне добриво
- не містить хлоридів, сульфатів і нитратів
- швидко засвоюється рослиною через лист
- не містить баластних речовин

МІКРОДОБРИВО БАСТ NPK Плюс 0-80-500

Контакти:

+38044 374 50 43

info@bast.land
www.bast.land

м. Київ, вул. Козацька 116, офіс 202

www.bast.land

BAST
ФОРМУЛА ВАШОГО ВРОЖАЮ

РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВА БАСТ NPK Плюс 0-80-500

- компенсує нестачу калію в критичні фази розвитку
- підсилює відтік вуглеводів з пластинки листа в інші органи, а також синтез цукрів і високомолекулярних вуглеводів – крохмалю, целюлози, пектинових речовин, ксиланів
- збільшує осмотичний тиск клітинного соку і тим самим підвищує холодостійкість і морозостійкість рослин
- допомагає рослинам краще переносити короткочасні посухи
- значно підвищує стійкість рослин до захворювань і стресів
- значно покращує лежкість плодів і овочів
- підвищує врожайність та покращує якість врожаю

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

ЗЕРНОВІ
1,5-5 л/га від раннього кущіння до виявлення 2-го вузла. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

ТОМАТИ
1,5-3 л/га на початку формування плодів. За потреби повторити через 10 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

КУКУРУДЗА
2-5 л/га в фазу 4-6 листків, повторити в фазу молочно-воскової стиглості. Витрата води: 200-300 л/га.

СОНЯШНИК
1,5-3 л/га в фазі 4-6 листків до бутонізації, повторити обробку в фазу формування насіння. Витрата води: 200-300 л/га.

КАРТОПЛЯ
1,5-5 л/га в фазу бутонізації та після цвітіння з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 300-400 л/га.

ГОРОХ, КВАСОЛЯ, СОЯ
2-5 л/га до цвітіння та в фазу наливу бобів, за потреби повторити обробку через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

РІПАК
1,5-5 л/га в фазу 4-6 листків та в фазу бутонізації. За потреби повторити через 7-14 днів. Не застосовувати під час цвітіння. Витрата води: 200-300 л/га.

ВИНОГРАД
3-5 л/га після цвітіння 2-3 обробки з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 500-1000 л/га.

КАПУСТА
2-5 л/га на стадії 4-6 листків. За потреби повторити при помірному та тяжкому дефіциті з інтервалом 7-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

ЯБЛУКА, ГРУШІ
2-5 л/га під час розпускання бруньок; 2-5 л/га після цвітіння 2-3 обприскування з інтервалом 10-14 днів; 2-5 л/га після збирання врожаю до опадання листя. Витрата води: 500-1000 л/га.

БУРЯК ЦУКРОВИЙ
2-5 л/га від фази 6-10 листків. За потреби повторити обприскування 3-4 рази з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.

ЦИБУЛЯ
1,5-5 л/га, коли достатньо площі листя, щоб перехопити обприскування. Норма витрати води: 200-500 л/га.

ГАЗОН
2-5 л/га, як тільки почнеться ріст навесні. У разі помірного та тяжкого дефіциту калію повторіть застосування через 14 днів. Норма води: 500-1000 л/га.

ФУНКЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В РОСЛИНІ

Фосфор забезпечує енергією всі процеси в рослині, а співвідношення азоту та калію в живленні рослин, як дві противаги, баланс та співвідношення яких визначає спрямованість обмінних та синтетичних процесів, а дисбаланс призводить до суттєвого зниження кількісних та якісних показників урожаю.

- **АЗОТ.** Відповідає за білковий обмін та є елементом утворення органічної речовини. Регулює зростання вегетативної маси, визначає рівень врожайності.
- **ФОСФОР.** Головне призначення фосфору – прискорення обмінних процесів у клітинах, і, як наслідок – швидший перехід від цвітіння до плодоношення, краще визрівання насіння та плодів, підвищення опору до захворювань, прискорення формування кореневих систем рослин.
- **КАЛІЙ**. Відповідає за вуглеводний обмін. Посилює накопичення моноцукорів у плодових та овочевих культур, підвищує вміст сахарози у коренеплодах, крохмалю в картоплі, потовщує стінки клітин соломини злакових культур та підвищує стійкість хлібів до вилягання. Підвищує холодо- та морозостійкість рослин, допомагає рослинам краще переносити короткочасні посухи.
- **МІКРОЕЛЕМЕНТИ**. Покращують засвоєння макроелементів, стимулюють ріст та розвиток точок росту, стимулюють метаболізм та покращують стресостійкість рослин.