

## Технічна специфікація

| Найменування продукції | BAST NPK Plus 0-80-500<br>(БАСТ NPK Плюс 0-80-500)                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опис                   | Рідке РК добриво з збільшеним вмістом калію.<br>Не містить нітрати, сульфати, хлориди.<br>Призначене для позакореневого підживлення<br>сільськогосподарських культур. |
| Зовнішній вигляд       | прозора безбарвна рідина                                                                                                                                              |
| Розчинність у воді     | 100%                                                                                                                                                                  |
| pH                     | 10.5-13.0                                                                                                                                                             |
| Густина                | 1.55±0.05 г/см <sup>3</sup>                                                                                                                                           |
| Склад                  | 500 г/л - калій (K <sub>2</sub> O)<br>80 г/л - фосфор (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )                                                                                |
| Фасування              | 1 л, 5 л, 10 л                                                                                                                                                        |

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

| КУЛЬТУРА                        | BAST NPK Plus 0-80-500<br>(БАСТ NPK Плюс 0-80-500)                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ</b>         | Позакореневе підживлення: 1,5-5 л/га від раннього кушіння до виявлення 2-го вузла. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.                                                                       |
| <b>ТОМАТИ (відкритий ґрунт)</b> | Позакореневе підживлення: 1,5-3 л/га на початку формування плодів. За потреби повторити з інтервалом 10 днів. Витрата води: 200-300 л/га.                                                                                   |
| <b>КУКУРУДЗА</b>                | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га в фазу 4-6 листків, повторити в фазу молочно-воскової стиглості. Витрата води: 200-300 л/га.                                                                                             |
| <b>СОНЯШНИК</b>                 | Позакореневе підживлення: 1,5-3 л/га в фазі 4-6 листків до бутонізації, повторити обробку в фазу формування насіння. Витрата води: 200-300 л/га.                                                                            |
| <b>КАРТОПЛЯ</b>                 | Позакореневе підживлення: 1,5-5 л/га в фазу бутонізації та після цвітіння з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 300-400 л/га.                                                                                              |
| <b>БОБОВІ КУЛЬТУРИ</b>          | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га до цвітіння та в фазу наливу бобів, за потреби повторити обробку з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.                                                                    |
| <b>РІПАК</b>                    | Позакореневе підживлення: 1,5-5 л/га в фазу 4-6 листків та в фазу бутонізації. За потреби повторити з інтервалом від 7 до 14 днів. Не застосовувати під час цвітіння. Витрата води: 200-300 л/га.                           |
| <b>ВИНОГРАД</b>                 | Позакореневе підживлення: 3-5 л/га після цвітіння 2-3 обробки з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 500-1000 л/га.                                                                                                         |
| <b>КАПУСТА</b>                  | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га на стадії 4-6 листків. Повторити за потреби при помірному та тяжкому дефіциті з інтервалом 7-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.                                                        |
| <b>ЯБЛУКА, ГРУШІ</b>            | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га під час розпускання бруньок;<br>2-5 л/га після цвітіння два-три обприскування з інтервалом 10-14 днів;<br>2-5 л/га після збирання врожаю до опадання листя. Витрата води: 500-1000 л/га. |
| <b>БУРЯК ЦУКРОВИЙ</b>           | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га від фази 6-10 листків. За потреби повторити обприскування 3-4 рази з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.                                                                  |
| <b>ГАЗОН</b>                    | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га, як тільки почнеться ріст навесні. У разі помірного та тяжкого дефіциту калію повторіть застосування з інтервалом в 14 днів. Норма води: 500-1000 л/га.                                  |
| <b>ЦИБУЛЯ</b>                   | Позакореневе підживлення: 1,5-5 л/га, коли достатньо площі листя, щоб перехопити обприскування. Норма витрати води: 200-500 л/га.                                                                                           |