

Технічна специфікація

Найменування продукції	BAST NPK Plus 35-105-210 (БАСТ NPK Плюс 35-105-210)
Опис	Рідке багатокomпонентне NPK добриво з збільшеним вмістом калію. Містить органічні та вільні L-амінокислоти. Призначене для позакореневого та кореневого підживлення сільськогосподарських культур.
Зовнішній вигляд	бірюзова рідина
Розчинність у воді	100%
рН	7.0-9.0
Густина	1.35±0.05 г/см ³
Склад	35 г/л - азот (N) 105 г/л - фосфор (P ₂ O ₅) 210 г/л - калій (K ₂ O) 20 г/л - L-аміно кислоти 60 г/л – органічні кислоти 2.0 г/л - марганець (Mn)* 1.5 г/л - бор (B) 0.6 г/л - цинк (Zn)* 0.6 г/л - мідь (Cu)* 0.5 г/л – залізо (Fe)* 0.25 г/л - молібден (Mo) *хелатовані EDTA
Фасування	1 л, 5 л, 10 л

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРА	BAST NPK Plus 35-105-210 (БАСТ NPK Плюс 35-105-210)
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ	Позакореневе підживлення: 2-4 л/га від початку кущення. 2-3 обробки з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 70-90 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ	Позакореневе підживлення: 2-4 л/га 2-3 обробки за період вегетації з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 35-100 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га
КУКУРУДЗА	Позакореневе підживлення: 2-4 л/га від фази 8-10 листків. За потреби повторити підживлення 2-3 рази з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 20-90 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га
СОНЯШНИК	Позакореневе підживлення: 2-4 л/га у фазі 8-10 листків до появи зірочки (бутонізації). За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 30-50 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га
БОБОВІ КУЛЬТУРИ	Позакореневе підживлення: 2-4 л/га на початку формування бобів. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 10-50 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га
РІПАК	Позакореневе підживлення: 2-4 л/га у фазі 8-10 листків, за потреби повторити обробку з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 10-50 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га
КАРТОПЛЯ	Позакореневе підживлення: 2-4 л/га перед цвітінням, повторити через 10-14 днів. Витрата води: 300-400 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі – 35-90 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га
ПЛОДОВІ ДЕРЕВА, ВИНОГРАД	Позакореневе підживлення: 3-5 л/га. Перше підживлення перед цвітінням, друге підживлення за три тижні до збору врожаю. За потреби повтори 2-3 рази з інтервалом 10-14 днів. Кореневе підживлення: 5 л/1000 літрів води для поливної суміші
БУРЯК ЦУКРОВИЙ	Позакореневе підживлення: 2-4 л/га з фази 8-10 листків. За потреби повторюють 2-3 рази з інтервалом 10-14 днів. Кореневе підживлення: при сівбі – 35-90 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га

Полив (фертигація)

ВСІ КУЛЬТУРИ	5 л/1000 літрів води. Загальна витрата добрива – 50-100 л/га за період вегетації.
---------------------	---